

UNA NOTA SOBRE LA CONTINUIDAD UNIFORME

Por

YU TAKEUCHI, U.N.

En los libros de la teoría de funciones de variable real, la definición de la continuidad uniforme es así;

DEFINICION 1

$f(x)$ es uniformemente continua en S si dada ϵ existe δ tal que

$$|x - y| < \delta \quad x, y \in S \text{ implica } |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

Este concepto se puede ampliar en la siguiente forma;

DEFINICION 2

$f(x)$ es uniformemente continua en S si dada ϵ existe δ tal que

$$|x - y| < \delta, \quad y \in S \text{ implica } |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

En este caso, x puede ser un punto exterior de S . (Evidentemente x debe pertenecer al dominio de $f(x)$.)

El teorema de Heine se puede modificar como sigue;

TEOREMA DE HEINE

Si $f(x)$ es continua en cada punto de un conjunto compacto S entonces $f(x)$ es uniformemente continua en S . (Nótese que el dominio de $f(x)$ puede ser más grande que S .)

Como aplicación de esta definición, se va a demostrar el siguiente teorema.

TEOREMA

$f(x)$ es integrable-Riemann en $[a, b]$ y además

$$f(x) = 0 \text{ si } x \in S, \quad 0 \leq f(x) \leq M \text{ si } x \notin S$$

$$\text{entonces} \quad \int_a^b f(x) \, dx \leq M \bar{m}(S)$$

NOTA

En base de la teoría de la integral-Lebesgue, la demostración es sumamente trivial ya que

$$\int_a^b f \, dx = \int_S f \, dx + \int_{[a,b]-S} f \, dx = \int_S f \, dx \leq M \int_S dx = M \bar{m}(S).$$

Sin embargo, para la integral Riemann, el primer paso de la igualdad anterior no es válido.⁽³⁾⁽⁴⁾

DEMOSTRACION

Sea D el conjunto de todos los puntos de discontinuidades de $f(x)$ en $[a, b]$ entonces

$$\bar{m}(D) = 0. \quad \text{Integrabilidad-Riemann de } f(x) \quad (3)(4) \quad (1)$$

$$\text{Sea} \quad S_0 = S \cup D \quad (2)$$

$$\text{entonces} \quad \bar{m}(S_0) \leq \bar{m}(S) + \bar{m}(D) = \bar{m}(S) \quad (3)$$

Dada ϵ , existe un número numerable de intervalos abiertos disyuntos;

$$I_k = (a_k, b_k) \quad k = 1, 2, 3, \dots \text{ tales que}$$

$$S_0 \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - a_k) \leq \bar{m}(S_0) + \frac{\epsilon}{2M} \quad (4)$$

(Definición de la medida exterior)

Como $\bigcup I_k$ es abierto, entonces

$$T = [a, b] - \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

es un conjunto cerrado, luego T es compacto, por lo tanto $f(x)$ es continua uniformemente en T (Def. 2). Es decir, dada ϵ existe δ tal que

$$|x - y| < \delta \quad x \in T \text{ implica } |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2(b-a)} \quad (5)$$

Tomamos una partición P de $[a, b]$ tal que la longitud de los sub-intervalos de P es menor que δ . Hay dos clases de sub-intervalos de P ;

Ⓐ Sub-intervalos que contienen por lo menos un punto de T (En donde $f(x) = 0$)

Ⓑ Sub-intervalos que contienen únicamente los puntos interiores de $\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$.

Entonces la suma superior de $f(x)$ con respecto a P;

$$U(P, f) = \sum_{\mathcal{A}} M_k \cdot \Delta_k x + \sum_{\mathcal{B}} M_h \cdot \Delta_h x \quad (6)$$

(M_k, M_h son $\sup f(x)$ en sub-intervalos y $\Delta_k x, \Delta_h x$ son longitudes de sub-intervalos;

$$\leq \frac{\epsilon}{2(b-a)} \sum_{\mathcal{A}} \Delta_k x + M \sum_{\mathcal{B}} \Delta_h x \leq \frac{\epsilon}{2(b-a)} (b-a) + M \sum_{k=1}^{\infty} I_k$$

$$\leq \frac{\epsilon}{2} + M \overline{m} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right) \leq \frac{\epsilon}{2} + M (\overline{m}(S_0) + \frac{\epsilon}{2M})$$

$$= M \cdot \overline{m}(S_0) + \epsilon$$

Por lo tanto se tiene:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) \leq \epsilon + M \cdot \overline{m}(S)$$

Como ϵ es cualquiera, el teorema queda demostrado.

NOTA En (5) y puede ser un punto de S_0 , por lo tanto, en (6) --
 $M_k = \sup f(x)$ (en el sub-intervalo de Ⓐ) es menor que $\epsilon / 2(b-a)$.

REFERENCIA

1. The theory of functions of real variables: James Pierponto
2. Real functions: Casper Goffmann
3. The theory of function of a real variable : E. W. Hobson
4. Mathematical Analysis : T.M. Apostol
5. Topologie Generale II : N. Bourbaki
6. Análisis Matemático : Teiji Takagui