Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas

Examen Final
Álgebra Lineal I
Septiembre 8 de 2014
Prof. Javier Camargo

Nombre: _____ Código: _____

Conteste de manera ordenada. No se permite uso de calculadoras ni ningún dispositivo electrónico.

1. (10 puntos) Resuelva:

- Calcular $5i(2 + 3i) + 4(6 - 2i)$.
- Calcular $\frac{1+2i}{2-i}$.
- Calcule el conjugado de $(1 + i)(1 - i)$.
- Escriba en forma polar $1 - i$.
- Encuentre todas las soluciones de la ecuación $z^3 = i$.

2. (8 puntos) Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, encuentre $\text{ren}(A)$ y $\text{nul}(A)$.

3. (8 puntos) Encuentre una base ortogonal de $\mathbb{R}^4$ que contenga los vectores $(1, -1, 0, 1)$ y $(1, 1, 1, 0)$.

4. (14 puntos) Sea $W = \{(x, y, z, w) : x = -2y = -w\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

- Encuentre una base de W .
- Calcule $W^\perp$.
- Encuentre una base ortogonal de W .
- Si $v = (1, 1, 1, 0)$ escriba $v = w + w'$ donde $w \in W$ y $w' \in W^\perp$.

5. (10 puntos) Encuentre la factorización QR de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN

1. (10 puntos) Resuelva:

- Calcular $5i(2 + 3i) + 4(6 - 2i) = 9 + 2i$.
- Calcular $\frac{1+2i}{2-i} = i$.
- Calcule el conjugado de $(1 + i)(1 - i) = 2$, luego el conjugado es 2.
- Escriba en forma polar $1 - i$. El argumento es $-\frac{\pi}{4}$ y $r = \sqrt{2}$, luego $1 - i = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i}$.
- Encuentre todas las soluciones de la ecuación $z^3 = i$. Debemos encontrar la raíz cúbica de i , estas son: $e^{\frac{\pi}{6}i}$, $e^{\frac{5\pi}{6}i}$ y $e^{\frac{9\pi}{6}i}$.

2. (8 puntos) Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, encuentre $\text{ren}(A)$ y $\text{nul}(A)$. Así, es fácil ver que $\text{ren}(A) = \text{gen}\{(1, 0, -1), (1, 1, 0)\} = \{(x, y, z) : x = t + s, y = s, z = -t\}$. Además, $\text{nul}(A) = \{(x, y, z) : -x = y = z\}$. Son solamente cálculos que se podían plantear de varias maneras.
3. (8 puntos) Encuentre una base ortogonal de $\mathbb{R}^4$ que contenga los vectores $(1, -1, 0, 1)$ y $(1, 1, 1, 0)$. Lo primero que debemos hacer es notar que los vectores $(1, -1, 0, 1)$ y $(1, 1, 1, 0)$ son ortogonales; es decir, el problema tiene solución. Completamos una base de $\mathbb{R}^4$. Por ejemplo, podemos construir la base $\beta = \{(1, -1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0)\}$ (cada quien la puede construir como considere). Para construir la base ortogonal, aplicamos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt:

- $w_1 = (1, -1, 0, 1)$.
- $w_2 = (1, 1, 1, 0) - \frac{(1,1,1,0) \cdot (1,-1,0,1)}{(1,-1,0,1) \cdot (1,-1,0,1)}(1, -1, 0, 1) = (1, 1, 1, 0)$.
- $w_3 = (1, 0, 1, 1) - \frac{(1,0,1,1) \cdot (1,-1,0,1)}{(1,-1,0,1) \cdot (1,-1,0,1)}(1, -1, 0, 1) - \frac{(1,0,1,1) \cdot (1,1,1,0)}{(1,1,1,0) \cdot (1,1,1,0)}(1, 1, 1, 0) = (1, 0, 1, 1) - \frac{2}{3}(1, -1, 0, 1) - \frac{2}{3}(1, 1, 1, 0) = (-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.
- $w_4 = (0, 1, 0, 0) - \frac{(0,1,0,0) \cdot (1,-1,0,1)}{(1,-1,0,1) \cdot (1,-1,0,1)}(1, -1, 0, 1) - \frac{(0,1,0,0) \cdot (1,1,1,0)}{(1,1,1,0) \cdot (1,1,1,0)}(1, 1, 1, 0) - \frac{(0,1,0,0) \cdot (-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})}{(-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \cdot (-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})}(-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = (0, 1, 0, 0) + \frac{1}{3}(1, -1, 0, 1) - \frac{1}{3}(1, 1, 1, 0) = (0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

De lo anterior, una base ortogonal de $\mathbb{R}^4$ que contiene a los vectores $(1, -1, 0, 1)$ y $(1, 1, 1, 0)$ es $\{(1, -1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (-\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}), (0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})\}$.

4. (14 puntos) Sea $W = \{(x, y, z, w) : x = -2y = -w\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

- a) Encuentre una base de W .
- b) Calcule $W^\perp$.
- c) Encuentre una base ortogonal de W .
- d) Si $v = (1, 1, 1, 0)$ escriba $v = w + w'$ donde $w \in W$ y $w' \in W^\perp$.

- a) Una base de W es $\beta = \{(2, -1, 0, -2), (0, 0, 1, 0)\}$.
- b) Para calcular $W^\perp$ debemos encontrar los vectores que son ortogonales a β ; esto es $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ tal que $(x, y, z, w) \cdot (2, -1, 0, -2) = 0$ y $(x, y, z, w) \cdot (0, 0, 1, 0) = 0$. Resolviendo este sistema homogéneo, tenemos que

$$2x - y - 2w = 0 \quad y \quad z = 0.$$

Así,

$$W^\perp = \{(x, y, z, w) : 2x - y - 2w = 0 \text{ y } z = 0\}.$$

- c) En nuestro caso, la base dada en la parte a) es ortogonal!, luego, $\beta = \{(2, -1, 0, -2), (0, 0, 1, 0)\}$ da respuesta a este punto. En caso de no ser ortogonal, debe aplicar Gram-Schmidt para ortogonalizar o buscarla de otra manera.
- d) Para escribir $v = w + w'$, debemos encontrar las proyecciones sobre W y $W^\perp$. Como tenemos una base ortogonal de W , entonces

$$\text{Proy}_W(v) = \frac{(1, 1, 1, 0) \cdot (2, -1, 0, -2)}{(2, -1, 0, -2) \cdot (2, -1, 0, -2)}(2, -1, 0, -2) + \frac{(1, 1, 1, 0) \cdot (0, 0, 1, 0)}{(0, 0, 1, 0) \cdot (0, 0, 1, 0)}(0, 0, 1, 0)$$

$$\text{Proy}_W(v) = \frac{1}{9}(2, -1, 0, -2) + \frac{1}{1}(0, 0, 1, 0) = \left(\frac{2}{9}, -\frac{1}{9}, 1, -\frac{2}{9}\right).$$

Ahora, como $v = \text{Proy}_W(v) + \text{Proy}_{W^\perp}(v)$, tenemos que

$$\text{Proy}_{W^\perp}(v) = (1, 1, 1, 0) - \text{Proy}_W(v) = (1, 1, 1, 0) - \left(\frac{2}{9}, -\frac{1}{9}, 1, -\frac{2}{9}\right) = \left(\frac{7}{9}, \frac{10}{9}, 0, \frac{2}{9}\right).$$

Finalmente,

$$(1, 1, 1, 0) = \left(\frac{2}{9}, -\frac{1}{9}, 1, -\frac{2}{9}\right) + \left(\frac{7}{9}, \frac{10}{9}, 0, \frac{2}{9}\right).$$

5. (10 puntos) Encuentre la factorización QR de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ortogonalizando las columnas de A tenemos

- $w_1 = (1, 1, 1)$.
- $w_2 = (1, 0, 1) - \frac{(1,0,1) \cdot (1,1,1)}{(1,1,1) \cdot (1,1,1)}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$.
- $w_3 = (1, 1, 0) - \frac{(1,1,0) \cdot (1,1,1)}{(1,1,1) \cdot (1,1,1)}(1, 1, 1) - \frac{(1,1,0) \cdot \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)}\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = (1, 1, 0) - \frac{2}{3}(1, 1, 1) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)$.

Ahora normalizando w_1, w_2 y w_3 tenemos la matriz Q :

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

Para encontrar R tenemos que:

- $(1, 1, 1) = [(1, 1, 1) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)]\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.
- $(1, 0, 1) = [(1, 0, 1) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)]\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) + [(1, 0, 1) \cdot \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)]\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) + \frac{\sqrt{6}}{3}\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)$.
- $(1, 1, 0) = [(1, 1, 0) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)]\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) + [(1, 1, 0) \cdot \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)]\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right) + [(1, 1, 0) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)]\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right) - \frac{\sqrt{6}}{6}\left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Luego

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

Así,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$